



CORONAVAC - VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) / INSTITUTO BUTANTAN

INSTRUÇÃO DE MANUSEIO

ARMAZENAMENTO



- A vacina deverá ser armazenada em câmara refrigerada a uma temperatura de +2°C a +8°C, protegida da luz, com prazo de validade de 12 meses a partir da data de fabricação.

PREPARO DE DOSES INDIVIDUAIS DE 0,5 ML DA VACINA CORONAVAC

- Realize a higienização das mãos.

A vacina deve apresentar-se como uma suspensão opalescente, com possível formação de precipitado estratificado, que pode ser disperso com homogeneização.

- Inspecionar visualmente o frasco. Esta vacina não deve ser utilizada caso haja alteração na coloração ou presença de partículas estranhas.



NÃO UTILIZAR A VACINA CASO HAJA ALTERAÇÃO NA COLORAÇÃO OU PRESENÇA DE PARTÍCULAS ESTRANHAS



- Homogeneizar a suspensão suavemente. Não Agite!

HOMOGENEIZAR SUAVEMENTE.
NÃO AGITE!

- Usando técnica asséptica, limpe o batoque do frasco com um algodão antisséptico de uso único.

Retire 0,5 ml da vacina utilizando uma seringa de 3 ml e agulhas de 20x5,5 dec/mm ou 25X6,0 dec/mm.



RETIRE 0,5 ML DA VACINA



- Os frascos devem ser registrados com a data e a hora da primeira utilização no rótulo do frasco.
- Após abertura do frasco conservar de +2 °C a +8 °C e utilizar em até 8 horas.

REGISTRE A DATA E HORA DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO NO RÓTULO DO FRASCO. USAR NO PRAZO DE 8 HORAS

ADMINISTRAÇÃO DA VACINA

- Verifique o volume de dosagem final de 0,5 ml.

Confirmar que não existe alteração na coloração ou presença de partículas estranhas. Nenhum aglomerado deve ser encontrado após homogeneizar.

- Não administrar se a vacina apresentar descoloração ou contiver partículas.

- Administrar a vacina por via intramuscular (IM) de preferência no músculo deltóide, na parte superior do braço.



ADMINISTRE 0,5 ML VACINA POR VIA INTRAMUSCULAR (IM)

ATENÇÃO!

Se a quantidade de vacina restante no frasco não puder fornecer uma dose completa de 0,5 ml, descarte o frasco e qualquer volume remanescente.

Não é permitida a mistura de diferentes frascos para compor 1 dose.

Descarte qualquer vacina não utilizada caso o frasco tenha sido aberto em um prazo maior do que 8 horas.



- Cada frasco contém 1 dose (monodose) ou 10 doses (multidose).
- Cada dose a ser administrada deve conter 0,5 ml de vacina.
- O esquema vacinal corresponde a DUAS DOSES (D1 + D2).
- Intervalo de 28 dias entre as doses.



PERNAMBUCO